

トルバプタン OD 錠 3.75mg/7.5mg/15mg「ニプロ」 「効能・効果」、「用法・用量」一部変更承認取得のお知らせ

ニプロ株式会社(本社:大阪府摂津市、代表取締役社長:山崎 剛司)は、トルバプタン OD 錠 3.75mg/7.5mg/15mg「ニプロ」につきまして、2026年4月20日付で、以下のとおり、効能・効果、用法・用量の一部変更承認を取得しましたことを、お知らせいたします。

[承認内容] (※下線部分が追加されました。)

効能・効果	<p>〈トルバプタン OD 錠 3.75mg「ニプロ」、トルバプタン OD 錠 7.5mg「ニプロ」〉</p> <p>○ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留</p> <p>○ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留</p> <p><u>○腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制</u></p> <p>〈トルバプタン OD 錠 15mg「ニプロ」〉</p> <p>○ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留</p> <p><u>○腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制</u></p>
用法・用量	<p>〈心不全における体液貯留〉</p> <p>通常、成人にはトルバプタンとして15mgを1日1回経口投与する。</p> <p>〈肝硬変における体液貯留〉</p> <p>通常、成人にはトルバプタンとして7.5mgを1日1回経口投与する。</p> <p><u>〈常染色体優性多発性のう胞腎〉</u></p> <p><u>通常、成人にはトルバプタンとして1日60mgを2回(朝45mg、夕方15mg)に分けて経口投与を開始する。</u></p> <p><u>1日60mgの用量で1週間以上投与し、忍容性がある場合には、1日90mg(朝60mg、夕方30mg)、1日120mg(朝90mg、夕方30mg)と1週間以上の間隔を空けて段階的に増量する。なお、忍容性に応じて適宜増減するが、最高用量は1日120mgまでとする。</u></p>

ニプログループは今後とも、患者さんのQOL(Quality of life)向上はもちろんのこと、より安全で、社会のニーズに応えられる製品の開発、提供に努めてまいります。

お問い合わせ先

報道機関の皆さま: コーポレートコミュニケーション部 PR室

TEL 06-6310-6650

その他の皆さま : 製品マーケティング部

TEL 06-6310-6958

※受付時間 9時~17時45分(土・日・祝日・当社休業日を除く)

このニュースリリースは、報道関係者や株主・投資家等の皆さまを含む多くのステークホルダーに対し、当社の企業活動に関する情報やその仕組み概要について、公平かつ適切なタイミングで提供することを目的としています。

文中に含まれる当社取扱製品やサービスに関する情報は顧客誘引や医学的アドバイスを意図するものではありません。